


## ABC EN REANIMACIÓN:



### A Asegurar la apertura de la vía Aérea

Colocar al niño sobre una superficie firme, no acolchada; en posición "de olfateo": el cuello debe estar extendido (nunca flexionado) y la cabeza ligeramente hacia atrás. Retirar la ropa del pecho. Retirar secreciones si es necesario; puede hacerlo con la ayuda de una "perita". Evaluar si el niño respira durante no más de 10 segundos.

**A**

### B Iniciar la ventilación Boca a Boca



El éxito de la maniobra se basa en hacer un sello firme entre nuestra boca y la boca-nariz del niño, sin dejar que se escape el aire. La efectividad de la maniobra se comprueba mirando el tórax elevarse con cada soplido, como si estuviera respirando por sus propios medios. Si la maniobra no es efectiva, controlar:

- Posición de la cabeza,
- Sello
- Fuerza del soplido.

Iniciar con dos soplos efectivos. Si el niño no mejora (no llora, no tose ni comienza a respirar) continuar con C.

### C Circulación - Compresiones cardíacas

Efectuarlas en el tercio inferior del esternón (por debajo de la línea imaginaria entre las tetillas) Presionar hacia abajo con dos dedos, con la fuerza necesaria para deprimir el tórax con cada compresión, unos 4 centímetros en los menores de 1 año y 5 en los mayores. NO LEVANTAR LOS DEDOS: mantener en contacto con el área de compresión todo el tiempo, con los dedos perfectamente verticales.



**¿Cuándo suspender las compresiones y las ventilaciones?**  
Cuando el niño haya mejorado (inicie llanto, tosa, se mueva, cambie al color rosado de piel y mucosas)

## TELÉFONO ÚTILES EN CÓRDOBA CAPITAL:

Emergencias Municipalidad:	107
Emergencias (Policía):	101
Emergencias toxicológicas (Centro Nacional de Intoxicaciones):	0800 - 333 - 0160
Hospital de Niños:	0351 - 4586405
Hospital Pediátrico:	0351 - 4346060
Hospital Misericordia:	0351 - 4344107
Hospital Materno Neonatal:	0351 - 4348350
Maternidad Provincial:	0351 - 4348760
Hospital Infantil Municipal:	0351 - 4335452
Maternidad Nacional:	0351 - 4332014



# REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) EN NIÑOS Y NIÑAS

Información para la familia

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN  
DE MATERNIDAD E INFANCIA

SECRETARÍA DE PREVENCIÓN  
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Ministerio de  
**SALUD**

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE  
**CÓRDOBA**

**ENTRE  
TODOS**

Durante una emergencia, es importante mantener la calma y actuar con seguridad. Para eso, es necesario pensar en forma previa la situación y repasar los pasos que deben darse en ese momento:

1. Comenzar con la reanimación
2. Pedir ayuda
3. Trasladar al niño a un centro médico

Es importante que usted tenga previsto:

- El lugar al cual llevará a su hijo o hija en caso de emergencia
- Cómo llegar hasta allí
- Si el lugar funciona las 24 hs del día los 365 días del año
- Qué medio de transporte utilizará:
  - Ambulancia del servicio de emergencia público o privado (si cuenta con un servicio a través de su obra social o prepaga, o si llamará al servicio público local; en ambos casos, tener el número siempre a mano)
  - Taxi - remis
  - Auto propio o de algún vecino que esté disponible

Es importante tener previsto con quién dejaría a los otros niños de la casa o personas que requieran cuidado, en el momento de una emergencia.

## EVALUACIÓN INICIAL DEL NIÑO:

### Observar:

- color de piel y mucosas
- tono muscular
- respuesta a estímulos
- respiración

### Si nota:

- + Cambio brusco de color
- + tono disminuido (blando)
- + falta de respuesta a estímulos
- + falta de respiración

**iniciar la reanimación**

## ALGORITMO DE REANIMACIÓN EN LACTANTES. CURSO PARA PADRES

