

**Mortalidad - Provincia de Córdoba**

La tendencia de la **tasa de mortalidad general en la provincia de Córdoba** entre los años 1998 a 2010, muestra una variación máxima de 1 punto (Valor máximo 8,4‰ en 1999 y 2007 – Valor mínimo 7,4‰ en 2000) (gráfico 1).



En la tabla 1 se presenta la distribución de la **tasa de mortalidad general, según departamentos provinciales.**

Las **tasas de mortalidad por causas** muestran que 9 de las 10 primeras causas de muerte en la provincia se debieron a Enfermedades No Transmisibles, representando mayores riesgos de mortalidad que las enfermedades transmisibles (gráfico 2). Estas diferencias también se encuentran en el análisis por sexo, siendo las insuficiencias cardíacas, la taquicardia paroxística y los infartos de miocardio, las primeras causas de muerte tanto para hombres como para mujeres (gráfico 2).


**Tabla 1. Tasa de mortalidad por sexo y por Departamento de la provincia de Córdoba. Año 2010.**

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	TASA BRUTA DE MORTALIDAD		
	SEXO		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	
Sobremonte	14,8	8,3	11,7
Tercero Arriba	10,4	9,7	10,0
Unión	10,5	9,4	9,9
Punilla	10,4	9,5	9,9
San Javier	10,3	8,8	9,5
Marcos Juárez	10,2	8,7	9,5
San Justo	10,2	8,5	9,3
Río Cuarto	9,5	9,0	9,3
Minas	9,7	8,8	9,3
General San Martín	9,4	8,7	9,1
Pte. R Sáenz Peña	9,8	8,2	9,0
Río Segundo	10,1	7,8	8,9
Río Seco	7,6	9,3	8,4
Ischilín	9,5	7,3	8,4
Juárez Celman	8,5	7,2	7,8
General Roca	8,2	7,1	7,7
Cruz del Eje	8,3	6,7	7,5
Capital	7,8	7,2	7,5
Santa María	8,0	6,5	7,3
Colón	7,5	6,2	6,9
Calamuchita	7,5	6,2	6,8
Río Primero	7,5	6,0	6,8
Tulumba	7,2	5,7	6,4
Totoral	6,6	5,5	6,1
Pocho	4,8	5,8	5,3
San Alberto	5,5	4,9	5,2
<b>Total Provincial</b>	<b>8,6</b>	<b>7,7</b>	<b>8,2</b>

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la provincia de Córdoba


La tendencia de **mortalidad por causas agrupadas** en el período 2004-2010, muestra que la mortalidad por enfermedades cardiovasculares es la causa de mayor riesgo, presentando su mayor tasa en el año 2010 (320‰). En el mismo período los tumores alcanzaron tasas entre 158‰ y 167‰. Las causas de mortalidad por enfermedades infecciosas y por causas externas alcanzaron valores que no superan el 67‰ y 49‰ respectivamente en el período. Todas las demás causas de defunción, alcanzaron tasas entre 191‰ y 250‰ (gráfico 3).

**Gráfico 2. Tasa de mortalidad específica por causa y sexo (10 Primeras causas de mortalidad). Provincia de Córdoba. Año 2010.**



Fuente: Indicadores Básicos de Salud – Provincia de Córdoba. Año 2010.

**Gráfico 3. TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR CAUSA (x 100.000 habitantes). Provincia de Córdoba. Años 2004-2010.**



Fuente: Datos extraídos de Estadísticas vitales - Información Básica 2008.

Los datos disponibles del período 1998 a 2010 muestran un importante descenso de la **tasa de mortalidad infantil** (16,8 por mil nacidos vivos en 1998 a 11,1 por mil nacidos vivos en 2010) (gráfico 4).



La mortalidad infantil es un indicador que está relacionado con los niveles de pobreza y la calidad de los servicios de salud de las regiones, por lo que es importante resaltar que su descenso en la provincia de Córdoba se ve acompañado con la mejora de los indicadores socioeconómicos del período 2001 a 2010.

A la mortalidad infantil también es posible analizarla según **criterios de reductibilidad**. Esta clasificación se construye agrupando, entre otras, las causas de muerte en función de la patología, a fin de conocer en qué medida es posible reducir esas defunciones por medio de acciones en la atención de Salud Materno Infantil. Al respecto, en la provincia de Córdoba las primeras causas de mortalidad infantil se muestran en la siguiente tabla, y son difícilmente reductibles con acciones sencillas en el sistema de salud, o a través de la prevención, diagnóstico y/o tratamiento oportuno en el embarazo, en el parto y en el nacidos vivos (tabla 2).

**Tabla 2. Distribución porcentual de las cinco primeras causas de mortalidad Infantil. Provincia de Córdoba. Año 2008.**

MORTALIDAD INFANTIL		MORTALIDAD INFANTIL NEONATAL		MORTALIDAD INFANTIL POSTNEONATAL	
Causa	%	Causa	%	Causa	%
Dificultad respiratoria del recién nacido	16.1	Dificultad respiratoria del recién nacido	15.2	Malformación congénita del corazón	3.0
Prematurez	9.6	Prematurez	9.0	Sepsis del recién nacido	1.7
Sepsis del recién nacido	8.8	Sepsis del recién nacido	7.1	Muerte súbita del lactante	1.6
Malformación congénita del corazón	8.5	Malformación congénita del corazón	5.5	Hidrocefalo congénito	1.0
Otras malformaciones congénitas	4.3	Otras malformaciones congénitas	4.1	Dificultad respiratoria del recién nacido	0.9

Fuente: Departamento Central de Estadística-Secretaría de Programación Sanitaria-Ministerio de Salud Pcia. Cba.

Es importante remarcar que la **tasa de mortalidad materna** en la provincia de Córdoba presentó una tendencia en aumento en los últimos años y un marcado descenso en 2010. Mientras que en 2003 era de 1,4<sup>0</sup>/000, en el año 2008 de 3,4<sup>0</sup>/000 y en 2009 de 7,2<sup>0</sup>/000, en 2010 se registró en 4,4<sup>0</sup>/000, lo que representa 4 mujeres fallecidas por cada 10 mil nacidos vivos (gráfico 5).

