

## **PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS EN LA DEFINICIÓN DE IACS**

### **¿QUÉ SON LAS IACS?**

Toda infección que no esté presente o incubándose en el momento del ingreso en el hospital, que se manifieste clínicamente o sea descubierta por la observación durante la cirugía, procedimientos o pruebas diagnósticas o que sea basada en el criterio clínico. Se incluyen aquellas que, por su período de incubación, se manifiesten posteriormente al alta del paciente, se relacione con los procedimientos, actividad hospitalaria y/o los servicios ambulatorios.

La definición de IACS se basa en los siguientes principios:

#### **PRIMERO**

La información usada para determinar la presencia y la clasificación de una infección comprende varias combinaciones de hallazgos clínicos y resultados de laboratorio y otros test diagnósticos.

#### **SEGUNDO**

Es un criterio aceptado de infección, a menos que exista evidencia de lo contrario, el diagnóstico médico o quirúrgico de infección derivado de la observación directa durante la cirugía, endoscopia u otros estudios diagnósticos o basados en el juicio clínico.

#### **TERCERO**

Para que una infección sea definida como IACS, no debe haber evidencia de infección presente o incubándose en el momento del ingreso. Se considera IACS a la infección que ocurre en las siguientes situaciones especiales:

1. Infección que se adquiere en el hospital y aparece tras el alta.
2. Infección en el recién nacido como resultado del paso por el canal del parto.

## **CUARTO**

No se considera IACS a la infección que ocurre como resultado de las siguientes situaciones especiales:

1. Infección que se asocia con complicación o extensión de infecciones presentes al ingreso, a menos que un cambio de agente o de síntomas, sugiera la adquisición de una nueva infección.

2. Infección en un niño que es conocido o está probado que ha sido adquirida trasplacentariamente (Herpes simple, toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus y sífilis) y que comienza precozmente tras el nacimiento.

## **MORTALIDAD POR IACS**

Paciente en que la IACS causa directamente la muerte o contribuye de forma significativa al fallecimiento.

## **BROTE DE IACS**

Dos o más casos en una sala, servicio o institución de salud que guardan relación entre sí y que se compruebe que es producido por un agente común, en un período limitado de tiempo y que excede los límites de la incidencia habitual.