



TRATAMIENTO Y BACILOSCOPIA

Una vez confirmado un caso de TB, las acciones más importantes a tomar por parte del equipo de salud, son:

- > Iniciar inmediatamente el tratamiento y garantizar que se cumpla hasta la curación.
- > Controlar todos los contactos del caso para descartar otros posibles enfermos

Controles de baciloscopia o cultivo teniendo en cuenta la categoría de cada caso:

Tipo de caso	Examen de esputo para control
Categoría I Caso nuevo pulmonar con baciloscopia positiva	Realizar baciloscopia al: <ul style="list-style-type: none"> Final del 2do mes y, si el resultado es positivo, realizar cultivo Final del 4to mes y, si el resultado es positivo, realizar cultivo Final del 6to mes o final del tratamiento, en lo posible realizar cultivo
Categoría I Caso gravemente enfermo con baciloscopia negativa	Realizar baciloscopia al: <ul style="list-style-type: none"> Final del 2do mes y, si el resultado es positivo, realizar cultivo. Final del 6to mes o al final del tratamiento, en lo posible realizar cultivo.
Categoría II Caso con tratamiento previo	Realizar baciloscopia, cultivo y prueba de sensibilidad antes de iniciar el tratamiento. Realizar baciloscopia al: <ul style="list-style-type: none"> Final del 3er mes y, si el resultado es positivo, realizar cultivo. Final del 5to mes. Realizar baciloscopia y cultivo al final del 8vo mes o final del tratamiento.
Categoría III Caso nuevo	Realizar baciloscopia al: <ul style="list-style-type: none"> Final del 2do mes y, si el resultado es positivo, realizar cultivo. Realizar baciloscopia y cultivo al final del 6to mes o al final del tratamiento.

Tratamiento recomendado según lineamientos técnicos del Programa Nacional de TBC

CASO NUEVO	Fase inicial		Fase de continuación (uno de los siguientes esquemas)	
	Triple Asociación Rifampicina 150 mg/ Isoniacida 75mg/ Pirazinamida 400mg + Etambutol 400mg *	Cuádruple Asociación Rifampicina 150 mg/ Isoniazida 75 mg/ Pirazinamida 400 mg/ Etambutol 275 mg	Doble Asociación: Rifampicina 300 mg/ Isoniacida 150 mg Tratamiento diario	Doble Asociación: Rifampicina 300 mg/ Isoniacida 150 mg + Isoniacida 300 mg Tratamiento trisemanal
Duración	2 meses	2 meses	4 meses	4 meses
PESO	< 40 Kg	2 comprimidos TA + 2 comprimidos E	2 comprimidos	1 comprimido DA 1 comprimido DA + 1 comprimido H
	40-55 Kg	3 comprimidos TA + 3 comprimidos E	3 comprimidos	2 comprimidos DA 2 comprimidos DA + 1 comprimido H
	> 55 Kg	4 comprimidos TA + 4 comprimidos E	4 comprimidos	2 comprimidos DA 2 comprimidos DA + 1 comprimido H

* Se puede usar S en lugar de E.