

**Programa de Vacunación para Huéspedes Especiales**  
**Ficha de recolección de datos Pacientes adultos**

<u>Nombre y Apellido</u>		<u>Sexo</u>
<u>Fecha de Nacimiento</u>		<u>Edad</u>
<u>DNI</u>		
<u>Procedencia</u> Provincia: _____ Domicilio: _____ Departamento: _____ Teléfono: _____		<u>Médico a cargo:</u> <u>TE de contacto:</u> <u>Centro de vacunación:</u> <u>Vacunador:</u>
<u>Diagnóstico</u> <input type="radio"/> Patología hemato-oncológica (OH) Cáncer de órgano sólido (CS) <input type="radio"/> Trasplante células hematopoyéticas (TCH) <input type="radio"/> Trasplante de órgano sólido (TOS) <input type="radio"/> Otras enfermedades crónicas específicas <input type="radio"/> Asplenia funcional o anatómica <input type="radio"/> Tratamiento corticoideo <input type="radio"/> Inmunodeficiencia primaria <input type="radio"/> Otro tratamiento Inmunosupresor (TIS)		<u>Comentarios</u>

Vacuna	Indicación	Antecedente de vacunación			Dosis indicadas (aclarar fecha de aplicación)										
		SI	NO	N° dosis	1° dosis	Lote	2° dosis	Lote	3° dosis	Lote	4° dosis	Lote	5° dosis	Lote	
dTpa/dT	Universal														
Antigripal	< 65 años con: Enf resp o cardíaca crónica, corticoides, TIS, asplenia, CS, OH, TOS, TCH, obesos, DBT, IRC en hemod.														
VPN-23	Corticoides, asplenia, CS, OH, TOS, TCH. Otros: implante coclear, enf resp crónica, DBT, fístula LCR, insuf renal crónica, hemoglobinopatías														
HB	Corticoides, CS, OH, TOS, TCH, IRC en hemodiálisis, hepatopatía crónica.														
Hib	Asplenia, OH, TCH, TOS no vacunados en la infancia.														
IPV	Tto inmunosupresor, no inmunizados previamente. TCH.														
Meningococo tetravalente conjugada	Asplenia, TOS.														
HAV	OH, CS, TOS, TCH susceptibles. Enf hepática crónica.														
Triple Viral/ doble viral	OH y CS susceptibles, en remisión y sin quimioterapia, TOS pre-trasplante. Luego de dos años del TCH en pacientes en remisión y sin EICH														
Varicela	OH y CS susceptibles, en remisión y sin quimioterapia, TOS pre-trasplante. Luego de dos años del TCH en pacientes en remisión y sin EICH														
VPH	TOS, TCH														