

Recomendaciones ante la sospecha de casos VIGILANCIA DE PAROTIDITIS

¿Qué hacer ante la sospecha?

- Realizar la notificación individual y semanal por C2.
- Implementar acciones de control de foco.
- Notificación mediante el ingreso de datos al sistema informatizado vigente (SNVS C2 y SIVILA).
- Consultar a Epidemiología acerca de la necesidad de toma de muestra.

Definición de caso de PAROTIDITIS

- Caso sospechoso:

Enfermedad de comienzo agudo con tumefacción uni o bilateral, autolimitada a la parótida u otra glándula salival, de duración igual o mayor a 2 días y sin otra causa aparente.

- Caso confirmado:

- Caso sospechoso con laboratorio IgM (+) y/o PCR + en saliva.
- Caso sospechoso relacionado epidemiológicamente con otro caso confirmado (nexo epidemiológico). *Un caso confirmado por laboratorio no precisa reunir las características de la definición de caso sospechoso.*

- Definición de Brote: Ocurrencia de dos o más casos de parotiditis relacionados entre sí y ocurridos en el mismo período y lugar.

IMPLEMENTAR ACCIONES DE CONTROL DE FOCO

Con el objeto de interrumpir la cadena de transmisión y evitar la aparición de nuevos casos se recomienda:

- Aislamiento de los casos durante 10 días, Implementar medidas de higiene ambiental y personal.
- En grupos cerrados, evaluar estado inmunológico e implementar si corresponde vacunación
- Sensibilizar a los profesionales de la salud acerca de la importancia de la notificación de los casos sospechosos.
- Reforzar la vacunación al ingreso a las fuerzas armadas, cárceles, institutos educativos con dormitorios
- Notificar a todos los referentes efectores de salud del brote para alertar e intensificar la vigilancia.
- Notificar por C2 rápidamente los casos, investigar y responder a los brotes.

ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN

- Revisar esquema de vacunación con Triple Viral, comprobada por Carnet (se deben tener una dosis de Triple Viral hasta el ingreso escolar y dos dosis de la vacuna a partir del ingreso escolar).
- Si no tiene esquema completo para la edad, aplicar una dosis de Triple Viral según Calendario vigente.
- Si tiene una Triple Viral y una Doble Viral, aplicar una Triple Viral para completar el esquema recomendado que contiene el componente parotiditis.
- El personal de salud, personal militar o personas que conviven en condiciones de encierro se encuentran en los grupos de riesgo y tienen indicación de recibir dos dosis.
- Tener en cuenta que según el calendario nacional de vacunación, las persona entre 6 y 50 años de edad deben acreditar dos dosis de vacuna triple Viral.