

Vigilancia Intensificada de Parálisis Fláccida Aguda

DEFINICIONES DE CASO

CASO SOSPECHOSO:

Toda persona menor de 15 años que presente **parálisis flácida aguda**, por cualquier razón, excepto trauma grave ó persona de cualquier edad en la que se sospeche poliomielitis.

Son de NOTIFICACION OBLIGATORIA:

- * Síndrome de Guillan Barré
- * Mielitis Transversa
- * Meningoencefalitis
- * Polineuritis
- * Parálisis diskalémicas
- * Monoparesias
- * Polirradiculopatías.

MODALIDAD DE VIGILANCIA

- ▶ Notificación al Área de Epidemiología de la Provincia de Córdoba, dentro de las 24 hs.
- ▶ Se realiza notificación por planilla C2 semanal negativa.
- ▶ Llenado de ficha epidemiológica específica
- ▶ Toma de muestras:

Materia fecal: del caso dentro de los 14 días del inicio del cuadro (se aceptan muestras hasta los 60 días), no menos de una cucharada sopera en un frasco limpio de boca ancha.

Hisopado rectal: solo en situación de extrema gravedad del caso cuando no se pueda

enviar materia fecal. Enviar en medio de stuart o en frasco con solución fisiológica estéril

LCR: solo si es posible, se recomienda usar el mismo líquido de la punción diagnóstica, **NO REPUNZAR SOLO PARA OBTENER ESTA MUESTRA.** Tomar en la 1° semana de iniciado el cuadro clínico.

Suero: refrigerado, no congelar ni freezar.

▶ Investigar otros casos en el área.

▶ Controlar cobertura con vacuna Sabin, e implementar vacunación de bloqueo en caso de que fuera necesario.

- ✓ Informar a los padres sobre las ventajas de cumplir el calendario completo de vacunación.
- ✓ Investigar con monitoreos rápidos las coberturas para OPV en la población del área programática.
- ✓ Asegurar la aplicación de la 4° dosis de OPV en los niños menores de 5 años de edad y la dosis de refuerzo.
- ✓ Recordar que entre los 7 y 18 años de edad deben asegurarse 3 dosis de OPV.
- ✓ Aprovechar todas las oportunidades disponibles localmente para completar el calendario de vacunación.

▶ Si el caso índice fallece, se tomarán muestras de 5 contactos menores de 5 años, especificando la fecha de la última dosis recibida de vacuna sabin.

▶ A los 60 días evaluar el caso a fin de constatar la presencia o no de secuelas compatibles con poliomielitis.

NOTA: Cuando el caso es menor de 1 año de edad se investiga también Botulismo del lactante, por lo que en estas situaciones deben tomarse 2 muestras de materia fecal (una para Neurovirosis y otra para bacteriología) y 1 muestra de suero, acompañada también por la ficha correspondiente.