

## **Indicaciones para realización de Test PCR para Procedimientos Quirúrgicos**

14 de septiembre 2020

### **El screening poblacional preoperatorio no está recomendado**

Esta recomendación de no testear, debe aplicarse también a las derivaciones entre Instituciones de pacientes asintomáticos y que requieren cirugías de mayor complejidad. El uso de EPP y precauciones estándares de bioseguridad, deben emplearse **siempre**, considerando a todos los pacientes, como potenciales casos positivos para COVID-19.

En las siguientes poblaciones se realizará test de PCR para SARS COV-2 antes del ingreso hospitalario:

- Pacientes a quienes se les practicarán cirugías que involucren la vía aérea como Cirugías de ORL y Cabeza y Cuello.
- Pacientes con síntomas y signos de enfermedad respiratoria cuyo procedimiento sea impostergable, previa consulta con infectología.
- Pacientes que serán sometidos a trasplante de órganos sólidos y medula ósea.
- Contactos Estrechos de Casos Confirmados.

La realización de la PCR para SARS COV-2 será dentro de las 72 horas previas a la cirugía y luego de tener disponible la autorización administrativa, la totalidad del material necesario para la misma y estudios prequirúrgicos en condiciones. Si la PCR es negativa se continuará con la cirugía, si es positiva se suspenderá o, si fuera mandataria, se procederá a tratar al paciente con los recaudos y en la zona correspondiente a COVID-19. En los casos elegibles, y en los cuales, debido a la urgencia quirúrgica, no se pueda esperar el resultado del test, se procederá a realizar el procedimiento con todos los recaudos y recomendaciones para pacientes COVID-19 hasta tanto se reciba el resultado del test.